


Variété  
Sem-Partners  
Nouveauté 2010

Blé tendre d'hiver

# RIMBAUD

Inscription CTPS 2009

Une solution pour gagner:  
**Précocité, résistance à la verse et qualité !**



Zone du culture

Tolérant au chlortoluron

Nouveau

- pour semer en toute sécurité d'octobre à janvier
- pour une récolte précoce
- très productif
- semis possibles dès mi-octobre en zones précoces: Centre Ouest, Centre, Bassin Parisien, Ouest, Centre Est, Sud

Passe-partout !

- type 1/2 hiver à 1/2 alternatif (5) *type Garcia*
- peu sensible au froid (5)
- 1/2 précoce à montaison (4) *type Garcia*
- précoce à épiaison (7,5) *Apache - 1 jour*
- précoce à maturité *Apache - 1 jour*

Qualité

- **B.P.S (Blé Panifiable Supérieur)**
- profil technologique très proche de la variété Caphorn: bonne force boulangère (W), P/L voisin de 1 à 1.2, et bonne note de panification

Voir vers l'avenir !

**RIMBAUD**: La culture moderne !  
pouvoir décaler la date de semis sans prendre de risques,  
avec une récolte précoce,  
un rendement « parmi les meilleurs »  
et une qualité technologique recherchée.

« **encore N 1 en 2011 dans les essais Arvalis SO !** »  
**106 % de la MG (7 essais)**  
**soit 80,8 qx de moyenne**

Fiche technique mise à jour :  
décembre 2011

**Sem-Partners**  
La nouvelle dynamique des semences


57, rue de Marsinval – 78540 Vernouillet  
Tél : 01 39 71 85 60 - Fax : 01 39 28 01 33  
E-mail : sem-partners@wanadoo.fr

# RIMBAUD

**Productivité pluriannuelle**

**Résultats Arvalis 2010 (en quintaux)**

- Sud Bassin Parisien**  
Moyenne 99.7qx
- Centre**  
Moyenne 86.3qx
- Centre Est**  
Moyenne 97qx
- Poitou Charentes**  
Moyenne 76.7qx
- Limagne**  
Moyenne 105.3 qx
- Sud Est**  
Moyenne 91.8qx
- Sud Ouest**  
Moyenne 94.9qx



**98 essais**  
De 2007 à 2009

**Essais OS et distributeurs**

**103.1 %**  
Apache+Caphorn /2

**106 %**  
de Caphorn

**101.4 %**  
de Apache

**Rendement Traité (en % des témoins) Apache + Caphorn /2**

**Particularité RIMBAUD**  
apporte une bonne régularité de productivité sur 3 ans, en toutes régions. Son excellent tallage et sa très bonne fertilité épis contribuent à son haut niveau de rendement

**Caractéristiques générales**

**Cotations officielles GEVES**

**Productivité Zone Sud (T+NT/2): 103.7%**

en % témoins officiels: Aubusson+Apache+Caphorn /3

- Qualité technologique: **BPS (Blé Panifiable Supérieur)**
- Classe de dureté: **medium hard**
- Poids spécifique: **moyen (Caphorn - 1 point)**
- Alternativité: **5 (1/2 hiver à 1/2 alternatif)**
- Précocité épiaison: **7.5 (précoce)**
- Hauteur: **3 (courte)**
- Résistance à la verse: **7 (assez résistant)**

**Particularité**  
Un très bon équilibre entre le potentiel de rendement et une excellente qualité technologique  
Profil type Caphorn: bon W, P/L voisin de 1.2 et une note totale de panification comprise entre 260 et 270

**Maladies et résistances**

**Résistances:** cotations officielles GEVES

- au froid: **5** peu sensible
- à la rouille brune: **5** peu sensible
- à la rouille jaune: **6** peu sensible
- à l'oïdium: **5** peu sensible
- au piétin verse: **4** assez sensible
- à la fusariose: **4,5** peu sensible
- à la septoriose (S.tritici) **4.5** peu sensible

**Particularité**  
Une protection fongicide classique conviendra pour obtenir le meilleur de **RIMBAUD**

**Conseils de culture**

La densité de semis dépend de la date et des conditions d'implantation de la culture: prévoir entre 250 à 320 grains/m<sup>2</sup> dans des conditions optimum de semis de mi-octobre à fin décembre dans les régions Centre, Ouest et Sud et 320 à 350 grains/m<sup>2</sup> pour les semis de fin janvier. Compte tenu de son rythme de développement végétatif rapide, il est préférable de ne pas semer trop tôt à l'automne afin d'éviter tout risque de gel de l'épi dans la gaine. Le caractère 1/2 alternatif de **RIMBAUD** permet des semis tardifs d'automne et des semis de rattrapage. Pour les semis d'automne, il est toujours conseillé d'appliquer un régulateur. Une protection fongicide adaptée vous assurera rendement et qualité. La fumure azotée est raisonnée en fonction de l'objectif de rendement et du précédent cultural suivant la méthode du bilan N en veillant à limiter le 1<sup>er</sup> apport (maxi. 60 unités) et à privilégier le fractionnement en 3 apports.

**RIMBAUD** se récoltera précocement et facilement sans précautions particulières.